

## Bijregelschema zonder basisschema

Naam patiënt: \_\_\_\_\_

Geboortedatum: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Naam:

diabetesverpleegkundige/

praktijkondersteuner: \_\_\_\_\_

Telefoonnummer: \_\_\_\_\_

U corrigeert een afwijkende bloedglucose door het bijspuiten van kortwerkende insuline (Novorapid/Humalog/Apidra/Fiasp) **vóór de maaltijd**.

Correctieschema	
Glucose in mmol/l is:	Corrigeren met kortwerkende insuline: Novorapid, Humalog, Apidra, Fiasp met:
Tussen 11 en 15	..... Eenheden
Tussen 15 en 20	..... Eenheden
Hoger dan 20	..... Eenheden
Glucose voor de nacht in mmol/l	
Lager dan 4	4 tabletten druivensuiker/ranja + 15gram koolhydraten
Tussen 4 en 6	15 gram koolhydraten (= boterham/2 beschuiten/1 beschuit + glas melk)
Tussen 6 en 7	7 gram koolhydraten (= 1 beschuit/glas melk)
Glucose voor de nacht in mmol/l:	
> .....	+ ..... Eenheden kortwerkende insuline
> .....	+ ..... Eenheden kortwerkende insuline
<b>Let op:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Voor de nacht maximaal met 4 eenheden bijregelen.</b></li> <li>• <b>Bijregelen met <u>kortwerkende insuline</u>: Novorapid/Humalog/Apidra/Fiasp</b></li> <li>• <b><u>Niet bijregelen</u> voor de nacht bij prednison gebruik of lage nuchtere waardes</b></li> </ul>	