

Transmuraal Formularium Astma & COPD

| COPD | | Droog Poeder Inhalator (DPI) | | Ademgestuurde Dosisaerosol (pMDI) en Soft Mist Inhaler (SMI) | Dosisaerosol (pMDI) met voorzetkamer |
|-------------------|--|--|--|--|---|
| | Medium 40/50-60L/min Medium high 35-60L/min | Medium low 30-60L/min | | Low 20-60L/min | Low 20-60L/min |
| SABA | Salbutamol novolizer zn 100 - max 800 | Ventolin (Salbutamol) diskus zn 200 - max 800 | | Salbutamol redihaler zn 100 - max 800 | Salbutamol dosisaerosol zn 100 - max 800 |
| SAMA | | | | | Ipratropium dosisaerosol zn 20 - max 160 Berodual dosisaerosol zn 20/50, max 8 inh |
| LABA | Formoterol novolizer 2dd 12 - max 48 | | | Striverdi (Olodaterol) respimat 1dd 5mcg = max | Formoterol dosisaerosol 2dd 12 - max 48 |
| LAMA | Eklira (Aclidinium) genuair 2dd 322 = max | Incruse (Umeclidinium) ellipta 1dd 55 = max | | Spiriva (Tiotropium) respimat 1dd 5mcg = max | |
| LAMA/ LABA | Duaklir (Aclidinium/Formoterol) genuair 2dd 340/12 = max | Anoro (Umeclidinium/Vilanterol) ellipta 1dd 55/22 = max | | Spiolto (Tiotropium/Olodaterol) respimat 1dd 5/5 mcg = max | Bevespi (Glycopyrronium/ Formoterol) 2dd 2.7.2mcg/5mcg |
| ICS/ LABA | Foster (Beclometason/ Formoterol) nexthaler 2dd 100/6 - max 400/24 | Relvar (Fluticasonfuroaat/ Vilanterol) ellipta 1dd 92/22 = max | | | Foster (Beclometason/ Formoterol) dosisaerosol 2dd 100/6 - max 400/24 |
| ICS | | | | Qvar (Beclometason) redihaler 2dd 400, max 1600 | |
| ICS/LABA/ LAMA | Trimbow (Beclometason/Formoterol/ Glycopyrronium) nexthaler 87/5/9 - 2dd 2inh = max | Trelegy (Fluticasonfuroaat/ Vilanterol/Umeclidinium) ellipta 1dd 92/55/22 = max | | | Trimbow (Beclometason/Formoterol/ Glycopyrronium) dosisaerosol 87/5/9 - 2dd 2inh = max |

alleen na overleg longarts

Stappenplan inhalatiemedicatie (gebruik hiervoor het EVS)

| | Stap 1 Infrequente dyspneuklachten, geen longaanvallen | Stap 2 Regelmatische dyspneuklachten, hinder of beperkingen | Stap 3 Persisterende dyspneuklachten, hinder of beperkingen |
|---|--|---|---|
| Dyspneuklachten, hinder of beperkingen | SABA of SAMA, zo nodig | LAMA of LABA, onderhoud | LAMA + LABA, onderhoud |
| Longaanvallen, > 2 per jaar | Niet van toepassing | Voeg ICS toe* Start of continueer luchtwegverwijder | Voeg ICS toe. Bij voorkeur 1 luchtwegverwijder (overweeg de andere te staken). Overweeg verwijzing |

* Als de patient verder weinig klachten heeft, volstaat een LAMA